

Aleradina

desloratadina



Aleradina® combate os sintomas da rinite alérgica intermitente e persistente, da urticária e de outras alergias.¹



Controla os sintomas
por **24 horas** em
uma única dose¹



NÃO CAUSA SONOLÊNCIA^{1 2}

PARA O ALÍVIO DOS SINTOMAS DA RINITE ALÉRGICA, COMO:¹



Espirros



Corrimento Nasal



Coceira nos Olhos



Coceira e Congestão Nasal



Lacrimejamento e Vermelhidão dos Olhos



Coceira no Céu da Boca e Tosse



Sinais e Sintomas de Coceiras de Pele (urticária)

COMO FUNCIONA:^{2 3}



Aleradina® impede que a histamina (substância causadora da alergia) consiga agir. Bloqueia sua ação no local da alergia e evita a inflamação decorrente da resposta alérgica.



DOSAGEM XAROPE¹

Crianças de 6 a 11 meses de idade
2 mL (1 mg), 1 vez por dia

Crianças de 1 a 5 anos de idade
2,5 mL (1,25 mg), 1 vez por dia

Crianças de 6 a 11 anos de idade
5 mL (2,5 mg), 1 vez por dia

Adultos e adolescentes (maior ou igual a 12 anos de idade) 2 mL (1 mg), 1 vez por dia



DOSAGEM COMPRIMIDOS¹

Adultos e adolescentes (maior ou igual a 12 anos de idade)
1 comprimido revestido 5mg 1 vez por dia

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER PARTIDO, ABERTO OU MASTIGADO.

Independentemente da alimentação, para alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica (incluindo rinite alérgica intermitente e persistente) e urticária.

MULTILAB
FARMA

ALERADINA (desloratadina). Registro MS – 1.0583.0850. **USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES.** Indicações: **ALERADINA** é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, como: coriza (corrimento nasal), espirros e prurido nasal (coceira no nariz); ardor e prurido ocular (coceira nos olhos), lacrimejamento, prurido do palato (coceira no céu da boca) e tosse. Os sinais e sintomas oculares e nasais são rapidamente aliviados após a administração oral do produto. É também indicado para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele. **Contraindicações e precauções:** **ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.** **ALERADINA** pode passar para o leite materno. Deste modo, o uso de **ALERADINA** não é recomendado para mulheres que estejam amamentando. Uso em crianças: a eficácia e a segurança de **ALERADINA** em crianças menores de 12 anos de idade não foram estabelecidas. **ALERADINA** deve ser administrada com cautela em pacientes com histórico médico ou familiar de convulsões. Em particular crianças jovens podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento de novas convulsões sob tratamento com desloratadina. Caso apresente convulsões durante o tratamento, você deve procurar um médico, o qual poderá considerar a descontinuação do uso do medicamento. REFERÊNCIAS: 1- Bula do paciente e bula do profissional de saúde do medicamento **ALERADINA** - desloratadina comprimido revestido (5 mg) e xarope (0,5 mg/mL). GERMED FARMACÊUTICOS LTDA. 2- Church MK, Church DS. Pharmacology of antihistamines. Indian J Dermatol. 2013 May; 58(3):219-24. doi: 10.4103/0019-5154.110832. PMID: 23723474; PMCID: PMC3667286. 3- Farzam K, Sabir S, O'Rourke MC. Antihistamines. [Updated 2023 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538188/> Detentora: GERMED FARMACÊUTICA LTDA. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** JANEIRO/2024.