

# Buprovil

ibuprofeno

Suspensão  
**GOTAS**

**ALÍVIO DA DOR E FEBRE<sup>1</sup>**



Propriedades analgésicas e antipiréticas<sup>1</sup>



Indicado para redução da febre e alívio de dores em geral<sup>1</sup>



Sabor de frutas (100 mg/mL) e tutti-frutti (50 mg/mL)



## INDICAÇÕES<sup>1</sup>:



Dores decorrentes de Gripes e Resfriados



Dor de garganta



Dores Musculares



Dor de Cabeça



Dor de Dente



Dor nas Costas

## COMO FUNCIONA<sup>1</sup>:



O início de ação ocorre de **15 a 30 minutos** após sua administração oral e **permanece por 4 a 6 horas<sup>1</sup>**.

## COMO USAR<sup>1</sup>:

**Buprovil**  
ibuprofeno

**50**  
mg/mL

### Adultos:

Em adultos, a dose habitual do ibuprofeno, para febre é de 40 gotas (200 mg) a 160 gotas (800 mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia. A dose máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3.200 mg).

### Crianças:

A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia. A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos de idade é de 40 gotas (200 mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800 mg).

**Buprovil**  
ibuprofeno

**100**  
mg/mL

### Adultos

Em adultos, a dose habitual do BUPROVIL é de 20 gotas (200 mg) a 80 gotas (800 mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia. A dose máxima permitida por dia em adultos é de 320 gotas (3.200 mg).

### Crianças:

A dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade é de 1 gota/Kg de peso, em intervalos de 6 a 8 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia. A dose máxima por dose em crianças com mais de 30 Kg é de 20 gotas (200 mg) e a dose máxima permitida por dia é de 80 gotas (800 mg).

**MULTILAB**  
FARMA

BUPROVIL gotas 50 mg/mL (ibuprofeno). Reg. M.S. 1.1819.0380. | BUPROVIL gotas 100 mg/mL (ibuprofeno). Reg. M.S. 1.1819.0477 - **Indicações:** Buprovil é um medicamento indicado para redução da febre e para alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares. **Contraindicações:** é contraindicado a pacientes com úlcera gastroduodenal ou sangramento gastrointestinal. Este medicamento é contraindicado para menores de 6 meses de idade. **Referências:** 1) [BULA] MULTILAB Ind. e Com. de Prod. Farm. Ltda. Hortolândia/SP.

**NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÚLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** FEVEREIRO/2024.