

Dorsanol[®]

paracetamol

PARA: **REDUÇÃO DA FEBRE**
E PARA O **ALÍVIO TEMPORÁRIO** DE
DORES LEVES E MODERADAS¹



INDICAÇÕES^{1 2}:

ADULTOS

Comprimidos revestidos/Gotas

- Dores associadas a resfriados comuns
- Dor de cabeça
- Dor no corpo
- Dor de dente
- Dor nas costas
- Dores musculares
- Dores leves associadas a artrites
- Cólicas menstruais



BEBÊS E CRIANÇAS

Gotas

- Dores associadas a gripes e resfriados comuns
- Dor de cabeça
- Dor de dente
- Dor de garganta



COMO FUNCIONA^{1 2}:



Efeito rápido,
após 15 minutos
da administração oral.



Atua no centro **regulador da temperatura**
no Sistema Nervoso Central (SNC) e
diminui a sensibilidade para a dor.



Efeito prolongado
de 4 a 6 horas.

COMO USAR^{1 2}:

Comprimidos Revestidos:

Adultos e crianças acima de 12 anos

Dorsanol[®] 500 mg

**1 a 2 comprimidos,
3 a 4 vezes ao dia.**

Dorsanol[®] 750 mg

**1 comprimido
3 a 5 vezes ao dia.**

Gotas

Crianças abaixo de 12 anos

1 gota/kg até a dosagem máxima de 35 gotas por dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações em um período de 24 horas. Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos, consultar o médico antes do uso.

Adultos e crianças acima de 12 anos

Tomar 40 a 70 gotas a cada 4 a 6 horas, sem ultrapassar 70 gotas (1.000 mg) por administração e 280 gotas (4.000 mg) por dia.

MULTILAB
FARMA

Dorsanol[®] (paracetamol 500mg). M.S. 1.1819.0217. | Dorsanol[®] (paracetamol 750mg). M.S. 1.1819.0212. **Indicações Comprimidos:** Este medicamento é indicado em adultos para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais. **Solução oral (gotas)** M.S. 1.1819.0212. : **Adultos:** redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites e cólicas menstruais. **Bebês e crianças:** redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta. 1) Dorsanol[®] comprimidos [Bula]. Rio Grande do Sul: Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. 2) Dorsanol[®] solução oral [Bula]. Rio Grande do Sul: Multilab Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. **SAC:** 0800-600 06 60. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE JUNTO COM OUTROS MEDICAMENTOS QUE CONTENHAM PARACETAMOL, COM ALCÓOL, OU EM CASO DE DOENÇA GRAVE DO FÍGADO.** FEVEREIRO/2024.