

Aremaz[®]

Hedera helix L. (Araliaceae)
extrato seco 7 mg/mL

é indicado como
expectorante
em casos de
tosse produtiva¹.



COMO FUNCIONA¹.



Possui efeito mucolítico, ou seja, diminui a viscosidade das secreções facilitando a expectoração.



Possui efeito broncodilatador (com ação relaxante sobre o músculo liso brônquico).

Esses efeitos melhoram a respiração.

COMO USAR¹.

Aremaz <i>Hedera helix</i> L. (Araliaceae) extrato seco 7 mg/mL	2 a 5 anos	6 a 11 anos	A partir de 12 anos
Dose	2,5 mL	2,5 mL a 5,0 mL	2,5 mL a 7,5 mL
Frequência	2 vezes ao dia	2 a 3 vezes ao dia	1 a 3 vezes ao dia
Dose Máxima Diária	5,0 mL	10,0 mL	15,0 mL

MULTILAB
FARMA

Aremaz[®] *Hedera helix* L. (Araliaceae) extrato seco 7 mg/mL M. S. nº 1.1819.0231. **Indicações:** **Aremaz[®]** é indicado como expectorante em casos de tosse produtiva. **Contraindicações:** **Aremaz[®]** não deve ser usado em casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula ou à plantas da família das Araliaceae. Crianças com menos de 2 anos de idade não devem usar o medicamento devido ao risco de agravamento dos sintomas respiratórios. **Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade.** **Cuidados e advertências:** **Aremaz[®]** contém em sua fórmula sorbitol, que é metabolizado no organismo em frutose, sendo conveniente avaliar sua indicação a pacientes com intolerância a esta substância. A tosse persistente ou recorrente em crianças entre 2 e 4 anos requer diagnóstico médico antes do tratamento. Em caso de insuficiência respiratória, febre ou expectoração purulenta, recomenda-se uma avaliação médica específica. O uso concomitante com antitussígenos opioides, como codeína ou dextrometorfano, não é recomendado sem orientação médica. Recomenda-se cautela no uso em pacientes com gastrite ou úlcera gástrica. A segurança no uso do medicamento durante a gravidez e lactação não foi estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante a gravidez e lactação não é recomendado. **Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.** **Interações medicamentosas:** Não foram reportadas interações medicamentosas ou outras formas de interação, como com exames laboratoriais e não-laboratoriais ou alimentos. **Reações adversas:** **Aremaz[®]** pode provocar um ligeiro efeito laxante, provavelmente vinculado à presença de sorbitol em sua fórmula. Referência: 1 (Bula) **Aremaz[®]** - MULTILAB Ind. e Com. de Prod. farm. Ltda. Jaguariúni/SP - FEVEREIRO/2024.

AREMAZ[®] É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.