

# Aleradina

## desloratadina



**Aleradina®** combate os sintomas da rinite alérgica intermitente e persistente, da urticária e de outras alergias.<sup>1</sup>



**Controla os sintomas**  
por **24 horas** em  
**uma única dose**<sup>1</sup>



**NÃO CAUSA SONOLÊNCIA**<sup>1 2</sup>

### PARA O ALÍVIO DOS SINTOMAS DA RINITE ALÉRGICA, COMO:<sup>1</sup>



**Espirros**



**Corrimento Nasal**



**Coceira nos Olhos**



**Coceira e Congestão Nasal**



**Lacrimejamento e Vermelhidão dos Olhos**



**Coceira no Céu da Boca e Tosse**



**Sinais e Sintomas de Coceiras de Pele (urticária)**

### COMO FUNCIONA:<sup>2 3</sup>



**Aleradina®** impede que a histamina (substância causadora da alergia) consiga agir. Bloqueia sua ação no local da alergia e evita a inflamação decorrente da resposta alérgica.



#### DOSAGEM XAROPE<sup>1</sup>

**Crianças de 6 a 11 meses de idade**  
2 mL (1 mg), 1 vez por dia

**Crianças de 1 a 5 anos de idade**  
2,5 mL (1,25 mg), 1 vez por dia

**Crianças de 6 a 11 anos de idade**  
5 mL (2,5mg), 1 vez por dia

**Adultos e adolescentes (maior ou igual a 12 anos de idade)** 10 mL (5 mg), 1 vez por dia



#### DOSAGEM COMPRIMIDOS<sup>1</sup>

**Adultos e adolescentes (maior ou igual a 12 anos de idade)**  
1 comprimido revestido 5mg 1 vez por dia

**ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER PARTIDO, ABERTO OU MASTIGADO.**

Independentemente da alimentação, para alívio dos sintomas associados com a rinite alérgica (incluindo rinite alérgica intermitente e persistente) e urticária.

**MULTILAB**  
FARMA

**ALERADINA** (desloratadina). Registro MS – 1.0583.1035. **USO ORAL. USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 MESES.** **Indicações:** ALERADINA é indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite alérgica, como: coriza (corrimento nasal), espirros e prurido nasal (coceira no nariz); ardor e prurido ocular (coceira nos olhos), lacrimejamento, prurido do palato (coceira no céu da boca) e tosse. Os sinais e sintomas oculares e nasais são rapidamente aliviados após a administração oral do produto. É também indicado para o alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras alergias da pele. **Contraindicações e precauções:** ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA. ALERADINA pode passar para o leite materno. Deste modo, o uso de ALERADINA não é recomendado para mulheres que estejam amamentando. Uso em crianças: a eficácia e a segurança de ALERADINA em crianças menores de 12 anos de idade não foram estabelecidas. ALERADINA deve ser administrada com cautela em pacientes com histórico médico ou familiar de convulsões. Em particular crianças jovens podem ser mais vulneráveis ao desenvolvimento de novas convulsões sob tratamento com desloratadina. Caso apresente convulsões durante o tratamento, você deve procurar um médico, o qual poderá considerar a descontinuação do uso do medicamento. **REFERÊNCIAS:** 1- Bula do paciente e bula do profissional de saúde do medicamento ALERADINA - desloratadina comprimido revestido (5 mg) e xarope (0,5 mg/mL). GERMED FARMACÉUTICOS LTDA. 2- Church MK, Church DS. Pharmacology of antihistamines. Indian J Dermatol. 2013 May; 58(3):219-24. doi: 10.4103/0019-5154.110832. PMID: 23723474; PMCID: PMC3667286. 3- Farzam K, Sabir S, O'Rourke MC. Antihistamines. [Updated 2023 Jul 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538188/> Detentora: GERMED FARMACÉUTICA LTDA. **SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.** JANEIRO/2024.