

ProctoX[®]

acetato de hidrocortisona 5 mg/g (0,5%)
lidocaína base 20 mg/g (2,0%)
subgalato de bismuto 20 mg/g (2,0%)
óxido de zinco 100 mg/g (10,0%)

Alívio

no tratamento das hemorroidas



Indicado para¹:



Tratamento de hemorroidas



Alívio das dores locais

Como usar¹:



Uso adulto.
Uso externo.

Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia. Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.



MULTILAB
FARMA

ProctoX (Acetato de hidrocortisona 5 mg/g, lidocaína base 20 mg/g, subgalato de bismuto 20 mg/g, óxido de zinco 100 mg/g) **USO ADULTO USO EXTERNO** **Indicação:** Dor e sangramento de hemorroidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda (inflamação do ânus e reto) e fissuras. **Advertência:** Não utilizar no caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não foram estabelecidas a segurança e eficácia deste produto em crianças, gestantes e mulheres no período da amamentação. **SAC: 0800-600 06 60** MEDICAMENTO NOTIFICADO CONFORME RDC Nº 576/2021. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. PROCTOX É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. Maio/2024.